

短 報

富山湾で採集されたスナビクニン

* 稲 村 修

富山湾産のクサウオ科魚類で確認されているのは、ビクニン・イサゴビクニン・エゾクサウオ・クサウオ・アバチャン・ザラビクニンの6種である(南部・木戸, 1990)。今回、新たにスナビクニン *Liparis punctulatus* (Tanaka) を確認したので報告する。

文献について御教示いただいた富山市科学文化センターの南部久男学芸員、標本を同定していただいた石川県立水産高等学校の木戸 芳博士に厚くお礼申し上げます。

クサウオ科 Liparididae

スナビクニン *Liparis punctulatus* (Tanaka)

標本：全長30mm, 体長26mm


採集年月日：1985年8月6日

採集地：魚津市三ヶ地内の海岸, 沖合約20m

採集者：浜岸豊治(魚津水族館)

備考：波消しブロックの水深約2m地点で取られたカキ(死亡個体)の殻の間に入っていた。

本種は日本海に分布することが知られている(木戸, 1984; Kido, 1988)が、富山湾での記録はない。採集された個体は生時、体に斑点や縦走線がなくアカビクニンの特徴(木戸, 1984)を示していた。しかし近年、木戸(1988)によりホシビクニン・スジクサウオ・アカビクニンはスナビクニンのシノニムとされた。



引用文献

木戸 芳. 1984. クサウオ科. 解説. 日本産魚類大図鑑(益田 一・尼岡邦夫・荒賀忠一・上野輝彌・吉野哲夫編). 東海大学出版会, 東京. 323-326.

Kido, K. 1988. Phylogeny of the family Liparididae, with the taxonomy of the species

found around Japan. Mem. Fac. Fish., Hokkaido Univ., 35 (2):125-256.

南部久男・木戸 芳. 1990. 富山湾産クサウオ科魚類. 富山市科学文化センター研究報告, (13): 107-111.

* 魚津水族館：富山県魚津市三ヶ1,390